



date tehnice

Substanță activă	100 g/l alfa-cipermetrin
Formulare	Concentrat emulsionabil
Clasificarea	Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)
Număr certificat omologare	1058/29.02.1984
Ambalaj	1 L

caracteristici și mod de acțiune

Fastac® 10 EC este un insecticid din grupa piretrozilor de sinteză, cu acțiune prin contact și ingestie asupra adulților și larvelor.

modul de folosire omologat

cultura	agentul de dăunare		doza
	denumirea științifică	denumirea populară	
Grâu	<i>Eurygaster integriceps</i>	Ploșnița cerealelor	0,1 l/ha
	<i>Haplodiplosis marginata</i>	Viermele roșu al paiului	
Cereale păioase	<i>Lema melanopa</i>	Gândacul bălos	0,1 l/ha
Sfeclă	<i>Mamestra brassicae</i>	Buha verzei	0,1 l/ha
	<i>Chaetocnema tibialis</i> *	Puricele sfeclei	
	<i>Plusia gama</i>	Buha sfeclei	
Lucernă	<i>Phytodecta fornicata</i>	Gândacul roșu al lucernei	0,15 l/ha
	<i>Sitona spp.</i>	Gărgărița frunzelor	
	<i>Subcoccinella 24-punctata</i>	Buburuza lucernei	

* (2 tratamente)



Rapiță	<i>Meligethes aeneus</i>	Gândacul lucios	0,075 l/ha
	<i>Athalia rosae</i>	Viespea rapiței	0,2 l/ha
In	<i>Thrips linarius</i>	Tripsul inului	0,1 l/ha
Hamei	<i>Phorodon humuli</i>	Păduchele verde al hameiului	0,02 %
Cartof	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Gândacul din Colorado	0,1 l/ha
Tomate	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Gândacul din Colorado	0,01% (0,1 l/ha)
Legume	<i>Myzodes persicae</i>	Păduchele verde al piersicului	0,02 % (0,2 l/ha)
	<i>Macrosiphon euphorbiae</i>	Păduchele solanaceelor	
	<i>Thrips tabaci</i>	Tripsul tutunului	
Legume seră	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Musculița albă de seră	0,02% (0,2 l/ha)
Măr	<i>Cydia pomonella</i>	Viermele merelor	0,015% (0,225 l/ha)
	<i>Adoxophyes reticulana</i>	Molia pielitelor	
	<i>Lyonetia clerkella</i>	Omida minieră mică	0,008 %
	<i>Nepticula malella</i> <i>Lithocolletis blancardella</i>	Molia minieră sinuoasă Molia minieră marmorată	
Păr	<i>Leucoptera scitella</i> <i>Hoplocampa spp.</i>	Minierul frunzelor de măr Viespea fructelor	0,015 %
	<i>Hoplocampa spp.</i>	Viespea fructelor	0,015% (0,15 l/ha)
Prun	<i>Cydia funebrana</i>	Viermele prunelor	0,015% (0,15 l/ha)
	<i>Eurytoma schreinerii</i>	Viespea semințelor de prun	
	<i>Hoplocampa spp.</i>	Viespea fructelor	



modul de folosire omologat

cultura	agentul de dăunare		doza
	denumirea științifică	denumirea populară	
Piersic	<i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta</i>	Molia vărgată Molia fructelor	0,015% (0,15 l/ha)
	<i>Myzodes persicae</i>	Păduchele verde al piersicului	0,004 %
Cireș	<i>Rhagoletis cerasi</i>	Viermele cireșelor	0,015% (0,15 l/ha)
Pomicultură	<i>Eriosoma lanigerum</i>	Păduchele lănos	0,02% (0,3 l/ha)
	<i>Malacosoma neustria</i>	Inelarul mărului	
	<i>Erannis defoliaria</i>	Cotarul brun al pomilor	
	<i>Operophtera brumata</i>	Cotarul verde	
Vița de vie	<i>Lobesia botrana</i>	Molia verde a strugurilor	0.075 l/ha
Silvicultură	<i>Cryptorrhynchus lapathi</i>	Trombarul plopilor	0,4 l/ha
Pomi fructiferi*	<i>Hyphantria cunea</i>	Omida păroasă	0,02%
Livezi **	<i>Aphydae spp.</i>	Afide	0,015% (0,225/ha)
Arbori	<i>Hyphantria cunea</i>	Omida păroasă a dudului	0,02 %
	<i>Lymantria dispar</i>	Omida păroasă a stejarului	
	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Fluturele cu abdomen auriu	
Tutun	<i>Myzodes persicae</i> <i>Chloridea armigera</i>	Păduchele verde al piersicului Omida fructelor	0,2 l/ha (0,02%)

* (măr, prun) ** (pe rod și pepiniere)



recomandări

Fastac® 10 EC se recomandă a se aplica la avertizare, la depășirea pragului economic de dăunare, funcție de dăunătorul țintă. Este foarte important ca produsul să fie aplicat astfel încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor cu soluție.

avantaje

- Spectru larg de combatere.
- Acțiune rapidă, de șoc.
- Eficacitate dovedită.