



Maccani

Protecție avansată împotriva rapănului și făinării la măr

 **BASF**

The Chemical Company

Pentru fructe și frunze
spectaculos mai sănătoase.

Fungicide





Fungicide





date tehnice

Substanță activă	4% piraclostrobin + 12% ditianon
Formulare	Granule dispersabile în apă
Clasificarea	Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)
Număr certificat omologare	2731/19.12.2007
Ambalaj	1 Kg; 5 Kg

Fungicide



caracteristici și mod de acțiune

Maccani® este un fungicid pe bază de două substanțe active:

- Piraclostrobin, substanță activă modernă din familia strobilurinelor, cu efect uni-site și care are ca mod de acțiune inhibarea respirației mitocondriale. Aceasta duce la reducerea energiei necesare în procesele esențiale din celulele agentului patogen.

- Ditianon - a doua substanță activă, face parte din grupa chinonelor, cu efect multi-site, cu activitate de contact și preventivă, inhibând germinația sporilor. Maccani® este, astfel, un produs sistemic translaminar și protectant. Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid. O parte din substanța activă pătrunde în frunză datorită proprietăților de mișcare translaminară și sistemic locală. Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune. Parteneriatul celor două substanțe active și modurile de acțiune diferite permit realizarea unei strategii robuste anti-rezistență.

modul de folosire omologat

cultura	agentul de dăunare		doza
	denumirea științifică	denumirea populară	
Măr	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	Rapăn Făinare	0,15% (2.25 kg/ha)



recomandări

La măr se poate aplica începând cu fenofaza de buton roz, până la faza de creștere a fructelor (fructe de mărimea nucilor). Intervalul dintre stropiri este în general de 8-12 zile, adaptabil în funcție de presiunea de infecție. În cazul perioadelor cu presiune ridicată de infecție, intervalul între tratamente se va reduce la 7-10 zile. Maccani® se aplică preventiv. Numărul de tratamente cu produsul Maccani® trebuie să fie de maxim 30% din numărul total al tratamentelor (incluzând și alte produse din aceeași familie chimică), dar nu mai mult de 3 tratamente pe sezon. Produsul se va integra într-un program de combatere în alternanță cu produse ce au alt mod de acțiune.

avantaje

- Protecție de încredere împotriva bolilor, pentru un maximum de recoltă și calitate.
- Culturi sănătoase, cu asimilație îmbunătățită.
- Protecție de lungă durată datorită preluării depozitelor formate, cu bună rezistență la spălare.
- Produs cu două substanțe active, ușor de folosit.
- Două moduri diferite de acțiune, ce asigură un management de încredere al rezistenței.