

# Stroby® DF

## date tehnice

<b>Substanță activă</b>	50% kresoxim-metil
<b>Formulare</b>	Granule dispersabile în apă
<b>Clasificarea</b>	Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)
<b>Număr certificat omologare</b>	1807/04.12.1997
<b>Ambalaj</b>	0,2 kg

## caracteristici și mod de acțiune

Stroby® DF este un fungicid pe bază de kresoxim-metil, din familia strobilurinelor, care întrerupe transportul electronilor în lanțul respirator mitocondrial. Are acțiune preventivă și parțial eradicativă, însă, pentru siguranță și eficacitate ridicată, se vor aplica tratamente preventive. Se distribuie la suprafața frunzelor prin difuzie în faza gazoasă (caracteristică nouă de translocare), iar în interiorul frunzei are o minimă dispersie translaminară. Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid, particulele fiind absorbite în stratul subcuticular. Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune.

## modul de folosire omologat

cultura	agentul de dăunare		doza
	denumirea științifică	denumirea populară	
Măr	<i>Venturia inaequalis</i>	Rapăn	0,01 – 0,013%
	<i>Podosphaera leucotricha</i>	Făinare	
Păr	<i>Venturia pirina</i>	Rapăn	0,01%
	<i>Mycosphaerella sentina</i>	Pătarea albă	
	<i>Diplocarpon soraueri</i>	Entomosporioză	



Viță de vie

*Uncinula necator*

Făinare

0,2 kg/ha

### recomandări

La vița de vie este indicată aplicarea preventivă. Având în vedere specificitatea produsului, se recomandă aplicarea înainte de înflorire sau în perioada creșterii boabelor. Se va aplica maxim un tratament pe sezon, în alternanță cu produse cu alt mod de acțiune. La măr și păr: recomandarea **BASF** este de a aplica un tratament combinat Strobby® DF (cu efect uni-site) + Delan® 700 WDG pe bază de ditianon (cu efect multi-site), care dă cel mai bun efect practic împotriva făinării și rapănului.

### avantaje

- Rezistență la spălare.
- Durată lungă de acțiune.
- Distribuție în fază de vapori.
- Ușurință în aplicare.

Fungicide

