

# LINUREX 50 SC

## Erbicid

Certificat de omologare nr. 1732/23.01.1996

Substanța activă: Linuron 500 g/l

Formulare: SC (Suspensie concentrată)

Clasificare: T (Toxic); N (Periculos pentru mediu)

## Omologări în România

Cultura	Agenți de dăunare	Doza
Floarea soarelui, cartof	Buruieni dicotiledonate și unele monocotiledonate anuale	2,0 – 4,0 l/ha (preemergent)
Morcov, ceapă	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale	1,5 – 2,0 l/ha (preemergent)
Țelină	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale	1,5 – 2,0 l/ha (post emergent)

## MOD DE ACȚIUNE

**LINUREX 50 SC** conține substanța activă **linuron**, care acționează în preemergență împotriva majorității speciilor de buruieni dicotiledonate anuale, ca și a unor monocotiledonate, prin inhibarea germinației semințelor acestora. Datorită remanenței sale de circa 4 luni în sol, combate atât buruienile existente în momentul tratamentului, cât și pe cele care urmează să răsară în decursul a câteva săptămâni de la tratament.

## RECOMĂNDARI DE APLICARE

Produsul **LINUREX 50 SC** se aplică preemergent la floarea soarelui, cartof, morcov, ceapă și postemergent la țelină. La aplicare, se folosesc 200-400 l apă/ha. Nu se aplică pe solurile nisipoase, pe cele cu substanța organică sub 1% și pe soluri cu pH peste 6,8. După aplicarea tratamentului și până la recoltare trebuie să treacă 90 de zile la cartof și 60 de zile la celelalte culturi.