

BANJO 500 SC

Fungicid de contact împotriva manei

Certificat de omologare nr. 2716/25.10.2007

Substanța activă: Fluazinam 500 g/l

Formulare: SC (Suspensie concentrată)

Clasificare: N (Periculos pentru mediu)

OMOLOGĂRI ÎN ROMÂNIA

| Cultura | Agenți de dăunare | Doza |
|---------|---|-------------------|
| Ceapă | Mană (<i>Peronospora destructor</i>), Alternarioza (<i>Alternaria porri</i>) | 0,04 % (0,4 l/ha) |
| Cartof | Mană (<i>Phytophthora infestans</i>) | 0,3 – 0,4 l/ha |

MOD DE ACȚIUNE

BANJO 500 SC este un fungicid de contact cu acțiune preventivă împotriva manei (*Phytophthora infestans*) și cu efect antisporel.

Substanța activă **fluazinam** face parte dintr-o nouă clasă chimică – diarilamine, care se caracterizează printr-un risc scăzut de apariție a raselor rezistente. Se aplică preventiv, imediat ce condițiile climatice au atins parametrii necesari declanșării infecției. Acționează în direcția stopării germinării și producerii de spori în toate stadiile de dezvoltare. Intervalul dintre tratamente este de 7 – 14 zile și se va adapta în funcție de condițiile climatice și de evoluția bolilor.

De asemenea, asigură protecția preventivă a suprafeței foliare împotriva manei.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Primul tratament se aplică imediat ce condițiile climatice sunt favorabile apariției bolii sau la avertizare, dar înainte de apariția primelor simptome.

Când condițiile climatice nu sunt favorabile apariției și dezvoltării manei la cartof, primul tratament se aplică înainte ca sistemul foliar să acopere distanța dintre rânduri. Tratamentul se repetă la 5 – 14 zile, în funcție de condițiile climatice, evoluția culturii și severitatea atacului de mană.