

# MERPAN 50 WP

## Fungicid

Certificat de omologare nr. 305/27.12.1974

Substanța activă: Captan 50%

Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)

## OMOLOGĂRI ÎN ROMÂNIA

Cultura	Agenți de dăunare	Doza
Tutun	Mană ( <i>Peronospora tabacina</i> )	0,2%
Tomate	Mană ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Pătarea albă a frunzelor ( <i>Septoria lycopersici</i> ) Pătarea cafenie a frunzelor ( <i>Cladosporium fulvum</i> )	0,2% 0,2-0,25%
Castraveți	Mană ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	0,2%
Ceapă	Mană ( <i>Peronospora destructor</i> )	0,2%
Fasole	Antracnoza ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	0,25%
Măr	Rapăn ( <i>Venturia inaequalis</i> )	0,2%
Păr	Rapăn ( <i>Venturia spp.</i> )	0,25%
Prun	Pătarea roșie a frunzelor ( <i>Polystigma rubrum</i> )	0,25%
Piersic	Bășicarea frunzelor ( <i>Taphrina deformans</i> )	0,25%
Pomi fructiferi	Monilioza ( <i>Monilinia spp.</i> )	0,25%
Sâmburoase	Ciuruirea frunzelor ( <i>Stigmina carpophila</i> )	0,2%
Vița de vie	Mană ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Putregaiul cenușiu ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )	0,2%

## MOD DE ACȚIUNE

**MERPAN 50 WP** este un fungicid din grupa ftalimidelor, care conține 50% captan. Este un fungicid de contact cu acțiune preventivă, protectivă și de eradicare asupra unui larg spectru de ciuperci fitopatogene, acțiune manifestată prin blocarea proceselor de respirație celulară ale patogenilor. În funcție de condițiile climatice prezintă o remanență de 7-20 zile pe plantă. Favorizează cicatrizarea rănilor.

## RECOMANDĂRI DE APLICARE

**MERPAN 50 WP** se aplică în timpul vegetației prin stropire efectuată după indicațiile enunțate în buletinele de avertizare emise de centrele de specialitate. Se utilizează volume normale de apă. După aplicarea ultimului tratament și până la recoltare trebuie să treacă minim 2 săptămâni la ceapă, fasole, pomi fructiferi și 3-4 săptămâni la tomate și vița de vie.