

SHAVIT F 72 WDG

Fungicid complex

Certificat de omologare nr. 2104/11.04.2001

Substanța activă: Triadimenol 20 g/kg + Folpet 700 g/kg

Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)

Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)

OMOLOGĂRI ÎN ROMÂNIA

Cultura	Agenți de dăunare	Doza
Măr	Rapăn (<i>Venturia inaequalis</i>), Făinare (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,2 %
Viță de vie	Mană (<i>Plasmopara viticola</i>), Făinare (<i>Uncinula necator</i>), efect secundar pentru Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,2 % (2,0 kg/ha în 1000 l apă)
Tomate	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,2 % (2,0 kg/ha)
Castraveți	Mană (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Făinare (<i>Sphaeroteca fuliginea</i>)	0,2 % (2,0 kg/ha)
Pepeni verzi	Alternarioză (<i>Alternaria cucumerina</i>)	0,2 % (2,0 kg/ha)

MOD DE ACȚIUNE

SHAVIT F 72 WDG este un fungicid complex, care conține două substanțe active (**triadimenol** și **folpet**), cu acțiune sistemică și de contact împotriva celor mai importante boli care atacă culturile horticole:

- **triadimenol** (triazol), cu acțiune sistemică și translocare acropetală, conferă plantelor tratate protecție mai ales împotriva făinărilor și alternariozelor. Are efect rapid, preventiv, curativ și eradicant și manifestă acțiune reziduală de lungă durată.

- **folpet** (ftalimidă), cu acțiune de contact contra unui mare număr de boli, în special mănări, rapăn și monilioze. Are acțiune preventivă, împiedicând instalarea infecțiilor de la suprafața frunzelor și lăstarilor tineri, intervenind în blocarea respirației ciupercilor fitopatogene. Având acțiune multi-site, aceasta previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor și ca urmare constituie un partener recomandat pentru fungicidele sistemice.

Cele două substanțe active sunt complementare și sinergice iar prin combinarea lor într-un singur produs se asigură lărgirea la maxim a spectrului de combatere, reducerea dozelor de substanță activă folosite și prevenirea instalării rezistenței patogenilor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Plantații pomicole (măr)

SHAVIT F 72 WDG se aplică începând din faza de buton roz până la căderea fiziologică a fructelor (iunie), la avertizare sau preventiv, la acoperire în funcție de presiunea de infecție la interval de 10-12 zile. Stropirile se fac cu volum normal de soluție, folosind echipament terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

Vița de vie

SHAVIT F 72 WDG se va aplica cu predilecție după înflorit până la compactarea ciorchinilor pentru a asigura o protecție corespunzătoare contra făinării dar și a manei și în secundar contra infecțiilor de putregai cenușiu. În condiții severe de infecție cu mană (ploi frecvente și vreme caldă), produsul se va alterna cu produse sistemice specifice împotriva manei.

Legume în câmp

Produsul se va aplica la avertizare în volum normal de apă în funcție de gradul de dezvoltare al culturii.